


Vêlages groupés de printemps et monotraite, réussir sa transition


Prérequis?



Préparer la transition

- Améliorer la fertilité : utiliser le croisement qui permet de bénéficier de l'effet d'hétérosis (il augmente 8% la réussite en IA)


Exemple de croisement :



- Objectif vêlages 24 mois
Sortir les veaux à 15 jours : meilleure transition alimentaire et croissance permise par une herbe de qualité due au pâturage avec fil avant.

Investissements à prévoir?

- Pas d'agrandissement de bâtiments à prévoir si il y a une augmentation du cheptel. Pour cela, il faut en réformer avant l'hiver.
- Augmenter la capacité de logement pour les veaux, car les naissances sont groupées.




Passage en vêlages groupés de printemps

- 1 : Grouper les inséminations des génisses pour un vêlage au printemps
- 2 : Grouper les vêlages des VL en allongeant les lactations (groupage rapide) ou grouper progressivement par le renouvellement.

« La première année seules les génisses ont toutes vêlé au printemps. Puis ensuite progressivement les vaches. Au fil des années, chaque lot de primipare ayant vêlé au printemps, le nombre de vaches vêlant au printemps augmente chaque année » (M. Servel, exploitant en système VGP)

Finalités



Aspect économique

Voici les résultats économiques obtenus pour le groupe VGP* du CEDAPA suite à la transition :

	2013	2018	Evolution
Coût alimentaire / 1000 L de lait vendus	59,7 €	30,9 €	- 48 %
Dont coût des concentrés / 1000 L	24,5 €	4,7 €	- 81 %
Charges opérationnelles	32 884€	19 766€	- 39 %
Dont frais vétérinaires	3 344€	1 737€	- 48%

*Groupe de 10 exploitations qui ferment aujourd'hui leur salle de traite l'hiver. Ces exploitations étaient en système herbage avant la transition.

Exercice comptable 2017-2018		
	Groupe VGP	Moyenne CER
Lait vendu / VL (L)	4 175	7 699
EBE	84 320	94 517
EBE / 1000L vendus (€)	353	175
Annuités / UTHf (€)	16 724	25 323
Revenu dispo / UTHf (€)	38 296	28 380

Monotraite partielle

Prévoir une marge financière suffisante pour passer les mois sans rentrée d'argent.

Passage en monotraite lorsque la production est inférieure à 15 kg / VL / jour

Une perte de production de 25% , le TB se voit augmenter de 2,8g/kg et le TP de 1,5g/kg.

Commencer lorsque le troupeau sort jour et nuit. Si les vaches dorment à l'intérieur, il est préférable de traire le soir, afin d'éviter les pertes de lait sur la litière après le remplissage de la mamelle.

« On ne perd donc pas 25% de lait si on considère le quota matière grasse » (Valérie Brocard, IDELE)